

Bovenooglidcorrectie

Bij een bovenooglidcorrectie wordt het overschot aan huid, al dan niet in combinatie met onderliggend vetweefsel, verwijderd. De ingreep vindt plaats onder lokale verdoving.

Echte klachten

Een vermoeid uiterlijk, een sombere blik, hangende oogleden en hoofdpijn: het zijn veelgehoorde klachten van mensen die een ooglidcorrectie bij ons ondergaan. Een bovenooglidcorrectie kan deze klachten verhelpen.

Waarom zo scherp geprijsd?

Een ooglidcorrectie wordt bijna nooit vergoed door de zorgverzekering. In tegenstelling tot grote klinieken hebben wij lagere overheadkosten. Daarnaast is de ingreep uitstekend onder lokale verdoving te doen, waardoor u geen "roesje" nodig heeft en niet onnodig betaalt. Het is geheel pijnloos door de verdoving. Waarom te veel betalen als het niet hoeft? De techniek en het instrumentarium is gegarandeerd van



goede kwaliteit en van
hoog niveau.

Consult voor meer info

Voorafgaand aan elke behandeling vindt een uitgebreid informatiegesprek met de arts plaats. Tijdens dit consult zal de arts u vragen stellen over uw medische achtergrond en uw algemene gezondheidstoestand. Op basis van uw wensen en persoonlijke kenmerken bepaalt u samen met de arts de voor u meest geschikte behandeling. De arts neemt de ingreep met u door en geeft aan welke resultaten kunnen worden verwacht. Tevens worden de mogelijke risico's en complicaties die zelfs bij een veilige operatie als een ooglidcorrectie kunnen optreden met u besproken. De mogelijke complicaties die zich zouden kunnen voordoen treft u hieronder aan. Als u op basis van dit uitgebreide informatiegesprek besluit om tot een behandeling over te gaan, wordt een behandeldatum vastgesteld en zult u verdere aanwijzingen krijgen betreffende de voor- en nazorg.

Zijn de littekens duidelijk zichtbaar na de behandeling?

De incisie, de wondpleisterstrips (steristrips) en hechtingen (Seralon 5/0) zijn de eerste 5 dagen zichtbaar. De huid wordt volgens de beste techniek gehecht (intracutaan). In de huid van de oogleden bevindt zich weinig collageen waardoor deze huid over het algemeen opmerkelijk goed en snel geneest doordat er ook na de ingreep nauwelijks collageenvorming plaatsvindt. Het uiteindelijke resultaat is hierbij ook afhankelijk van uw wondgenezing en hoe uw lichaam zelf littekens maakt. Het deel van het litteken in de kraaienpootjes zal iets langer rood blijven.

Zijn er risico's en complicaties?

Complicaties na een ooglidcorrectie zijn zeer ongewoon. De ongemakken van zwelling, bloeduitstorting en roodheid van de littekens zijn van tijdelijke aard. Specifieke complicaties die na een blepharoplastiek kunnen optreden zijn asymmetrie, trek aan de oogleden en een nabloeding of infectie in de oogkas (in 0,04% van de gevallen veroorzaakt dit blindheid). Algemene risico's die na iedere ingreep kunnen optreden zijn onder andere een allergische reactie, infectie, nabloeding en een gestoorde wondgenezing. Licht ongemak, zoals bloeduitstortingen en een strak gevoel nemen vrij snel af. De lichte zwelling van de behandelde gebieden verdwijnt in de weken na de ingreep.

Komen de hangende oogleden weer terug?

Hoe lang het effect zichtbaar blijft is niet exact vooraf te voorspellen. Het natuurlijke verouderingsproces gaat door en de snelheid hiervan is individueel bepaald. De klok wordt

lokaal teruggezet in de tijd en zal enkele jaren effect geven.

Kan ik littekencrème gebruiken na de ingreep?

De littekens zijn een aantal maanden rood en zullen na verloop van tijd verbleken. U mag de littekens na 1 week insmeren met een vette crème en heel licht masseren. Zorgt u er wel voor dat de littekens beschermd blijven tegen overmatig zonlicht, bijvoorbeeld door het dragen van een zonnebril.

Wanneer mag ik weer sporten?

De meeste mensen gaan na een periode van twee weken weer sporten. Alleen als de bloeduitstortingen die na de ingreep ontstaan langer aanblijven, raden wij u aan daar nog even mee te wachten. Wanneer u iets van de grond wilt oppakken, buig dan niet voorover maar zak door de knieën.

Wanneer mag ik douchen of in bad?

Na drie dagen mag u weer voorzichtig onder de douche. Zorgt u ervoor dat het behandelde gebied niet nat wordt. Na 1 week kunt u ook weer in bad. De temperatuur van het water mag niet te hoog zijn, omdat dit het behandelde gebied kan doen zwellen. Ook is het beter om kort te douchen.

Wanneer kan ik weer mijn lenzen dragen?

Na 1 week kunt u weer normaal lenzen dragen, indien mogelijk al eerder.

Wanneer kan ik weer make-up gebruiken?

Na 2 weken kunt u weer make-up gebruiken. Let u er wel op dat u bij het verwijderen van de make-up niet te hard over het behandelde gebied wrijft.

Na hoeveel tijd kan ik weer aan het werk?

Na 5-7 dagen gaan de meeste mensen weer aan het werk. De hechtingen worden na 5 dagen verwijderd. Een week later mag het litteken eventueel gecamoufleerd worden.

E. Coster, versie 11 juli 2014